


# PRŮVODCE FARMÁŘE

## KOKCIDIÓZA



### Úvod

- kokcidiózy jsou stále častější příčinou průjmu u telat
- zvířata se nakazí kokciemi z prostředí
- onemocnění se projeví kdykoliv mezi 12–21 dnem po nákaze
- infekce parazita významně poškozuje střeva
- postižená zvířata mívají prudký průjem s příměsí krve
- významná bývá ztráta tělesné hmotnosti
- těžký průběh může znamenat smrt nebo chronické problémy





### Příčiny

- kokcidie je častý parazit na mnoha farmách
- onemocnění vzniká, pokud jsou mladá telata vystavena velkému množství parazitů
- infekce se přenáší ze zvířete na zvíře prostřednictvím kontaktu s infikovanými výkaly
  - nedostatečná dezinfekce stájového prostředí mezi jednotlivými skupinami telat
  - příliš velký počet telat ve skupině
  - malé množství podestýlky, nebo její špatná kvalita
  - nepřetržité používání stájí
  - kontaminace krmiv nebo vody výkaly (krmení ze země nebo z nízko umístěných žlabů)

### Dopad

- snížení přírůstků
- zvýšení nákladů na ošetřování
- oddálení doby prvního otelení
- zvýšení mortality a nutného vyřazování
- větší pravděpodobnost výskytu pneumonie

### Prevence

- konzultace s veterinářem v případě podezření na kokcidiózu
- pokud už jsou zjištěny projevy kokcidie, střevo je už poškozeno
- omezení rizika kontaktu telat s infikovanými výkaly
  - „vše dovnitř, vše ven „ – striktní hygiena a dezinfekce mezi jednotlivými skupinami telat
  - prevence kontaminace krmiv výkaly
  - izolace postižených zvířat (mohou kontaminovat prostředí)

### SHRNUTÍ

- velmi častý problém, významné ztráty
- prevence je nezbytná, léčba není tak účinná