

PRŮVODCE FARMÁŘE

PŘÍPRAVA MLÉČNÉ NÁHRAŽKY



Pro co možná nejlepší start vašich telat do života vydáte nemalé peníze za nej kvalitnější mléčnou náhražku. Zde je návod, jak vaše náklady využít co nejefektivněji.

Teplota

Voda používaná k míchání mléčného nápoje by neměla mít teplotu vyšší jak 45 °C – jinak by došlo ke zničení proteinu, který je pro tele nezbytný.

Teplota zkrmované směsi by měla být 37–39 °C. Pokud tomu tak není, nedojde k uzavření jícnového splavu a tekutina unikne do bachoru. Toto může být pak příčinou průjmů a nadmutí.


Koncentrace

Buďte důslední a přesní při míchání – můžete použít koncentraci mezi 10–15 % sušiny pro krmení dvakrát denně, ale pokud jste se rozhodli pro nějakou koncentraci, už ji neměňte!

Pro správné míchání mléčné směsi važte velmi přesně množství mléčného koncentráту. Pro koncentraci 12,5 % sušiny potřebujete 125 g ml. směsi a 875 ml vody. Vytvoříte tak 1 litr mléčného nápoje. Pokud ke směsi přidáte 1 litr vody, pak vytvoříte nápoj pouze s 11,1% sušinou!

Pro správný postup smíchejte poloviční množství vody (pod 45 °C) s celkovým množstvím směsi, rozmíchejte metličkou do hladka, dolijte zbytek vody a znovu rozmíchejte.

Zkontrolujte teplotu (37–39 °C) a můžete krmit.




1

Dejte poloviční množství vody o teplotě pod 45 °C do čistého kbelíku



2

Odvažte množství směsi



3

Přidejte mléčnou směs a rozmíchejte do hladké konzistence



4

Dolijte zbytek vody a dobře promíchejte



5

Zkontrolujte teplotu 37–39 °C a můžete krmit

